

CONSENSO AL TRATTAMENTO CON LASER CO2 FRAZIONALE

Data _____

Il sottoscritto _____ nato/a il _____
a _____ acconsento a sottopormi alla **seguito procedura**

_____ la natura e gli scopi della quale mi sono stati spiegati dalla Dott.ssa Stefania Miglietta con riferimento alle mie condizioni cliniche.

Acconsento a sottopormi ad eventuali misure diagnostiche e/o terapeutiche che si rendessero necessarie nel corso della procedura o in seguito alla stessa.

Il **laser CO2 frazionale** è una metodica indicata per il trattamento di rughe del viso, alcuni inestetismi da fotoaging (discromie, pori dilatati...) e smagliature. Possono essere trattate anche mani, collo e décolleté, ugualmente sedi di fotocronoinvecchiamento. Il suddetto laser può essere utilizzato anche in caso di cicatrici post-acneiche, melasma e cloasma.

Il suo meccanismo d'azione prevede che la cute non venga lesionata completamente, ma solo in piccole aree coniche. Dalle isole di cute sana interposte a queste microlesioni parte il processo di rigenerazione che permette una guarigione rapida, in genere in 5-7 giorni. In profondità, a livello dermico, il trattamento laser provoca riarrangiamento delle fibre collagene e attivazione dei fibroblasti, con produzione di nuovo collagene, acido ialuronico ed elastina.

Dopo l'intervento laser il paziente può avvertire **bruciore** per alcune ore e la zona trattata diventa **arrossata**. Tale eritema regredisce di solito in 1-3 giorni al viso. Possono occorrere 3-5 giorni in altri distretti corporei: la guarigione dipende dalla sede, dall'estensione dell'area trattata, dal fototipo e dalla profondità del trattamento. Il dolore è moderato e ben tollerato. In casi eccezionali possono manifestarsi erosioni,

vescicole e/o croste. L'esito cicatriziale rappresenta un evento eccezionale, normalmente non osservato ai dosaggi abitualmente utilizzati.

Controindicazioni al trattamento:

- Esposizione solare/UVA 15 giorni prima del trattamento
- Anamnesi per cicatrici ipertrofiche/cheloidi
- Uso di farmaci fotosensibilizzanti e anti-infiammatori (acido salicilico e derivati) in particolare nella settimana precedente il trattamento
- Herpes virus in atto
- Gravidanza/allattamento
- Lunga storia di terapia cortisonica
- Dermatiti nella regione di trattamento
- Malattie autoimmunitarie o del collagene

Possibili complicanze:

- Eritema transitorio
- Dolorabilità
- Prurito e gonfiore
- Piccoli ematomi
- Iper/ipopigmentazione

Data _____

Firma leggibile del Paziente

Firma leggibile del Medico
